

cicatrene

CREMA E POLVERE

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni rivolgersi al farmacista
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

CICATRENE crema

CICATRENE polvere

COMPOSIZIONE

Ogni grammo di crema e/o polvere contiene: *Principi attivi*: Neomicina solfato 3.300 UI; Bacitracina zinco 250 UI; Glicina 10 mg; L-Cisteina 2 mg; DL-Treonina 1 mg.

Ogni grammo di crema contiene: *Eccipienti*: Alcool di lana BP; Sorbitan trioleato; Poliossietilen sorbitan trioleato; Poliossietilen lauril etere; Paraffina solida; Paraffina liquida; Paraffina molle.

Ogni grammo di polvere contiene: *Eccipienti*: Amido di mais; Ossido di magnesio.

COME SI PRESENTA

Tubo da 15 g di crema; Flacone da 15 g di polvere.

CHE COSA È

Associazione di antibiotici ed aminoacidi per uso locale.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Johnson & Johnson S.p.A. Via Ardeatina km 23,500 - 00040 Santa Palomba - Pomezia ROMA

PRODUTTORI

Produttore e controllore finale della polvere:

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.l. - Via del Mare 36 - 00040 POMEZIA (Roma)

Produttori e controllori finali della crema:

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.r.l. - Via del Mare 36 - 00040 POMEZIA (Roma)

Famar Orléans - 5 Avenue de Concyr - 45071 ORLEANS CEDEX 2 (Francia)

PERCHÈ SI USA

CICATRENE si usa in caso di infezioni cutanee superficiali: follicoliti (infezioni dei follicoli), foruncolosi, piccole bruciature e ferite infette.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

CICATRENE non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota o presunta verso i componenti. Non utilizzare nelle affezioni del condotto uditivo in caso di perforazione della membrana timpanica, nè con bendaggio che risulti occlusivo, nè in vicinanza degli occhi.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Nella prima infanzia usare solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Nelle donne in gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

Bambini: Nei bambini le pieghe cutanee o il pannolino possono fungere da bendaggio occlusivo.



QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Non è consigliabile la somministrazione contemporaneamente ad altri antibiotici aminoglicosidici (Kanamicina, Gentamicina, Framicetina etc.).

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o al farmacista.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

L'uso ripetuto o prolungato può dare origine a fenomeni di ipersensibilità che richiedono la sospensione della terapia e la consultazione del medico.

È possibile che soggetti che presentino ipersensibilità ad altri antibiotici aminoglicosidici (Kanamicina, Gentamicina, Framicetina etc.) sviluppino quest'ultima anche nei confronti del CICATRENE.

L'uso prolungato e l'impiego del prodotto su zone estese di pelle od ulcerate può comportare un assorbimento eccessivo di Neomicina con segni di tossicità del rene e/o dell'orecchio specie in soggetti con disturbi della funzione del rene già presenti e/o trattati contemporaneamente con altri farmaci dannosi per l'orecchio od il rene.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento delle sue caratteristiche.

Non superare le dosi ed i tempi consigliati. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Quanto, quando e per quanto tempo

Dopo pulizia della lesione applicare un sottile strato di crema o un leggero spruzzo di polvere due volte al giorno rinnovando la medicazione.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Il CICATRENE è disponibile solo in preparazioni per uso locale ed una intossicazione acuta per assorbimento generale è perciò improbabile a meno che non vengano trattate estese zone prive di pelle.

Vi è solo la possibilità di ingestione accidentale che probabilmente darebbe origine a sintomi a carico dello stomaco e dell'intestino ed eventualmente a tossicità a carico dell'orecchio.

In caso di ingestione accidentale, avvertite immediatamente il vostro medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Con l'uso del prodotto sono possibili reazioni locali o generali di ipersensibilità ai componenti (arrossamento, gonfiore, prurito) o sviluppo di ulteriori infezioni da parte di germi non sensibili all'associazione Neomicina-Bacitracina.

Poichè tali manifestazioni possono aggravarsi è necessario alla loro prima comparsa interrompere il trattamento e consultare il medico.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell' Agenzia Italiana del Farmaco: Giugno 2011.

F308537